

Link do produktu: <https://www.diawoli.pl/vitapol-activin-na-trawienie-dla-gryzoni-i-krolikow-100ml-4165-p-1021.html>



VITAPOL ACTIVIN NA TRAWIENIE dla gryzoni i królików 100ml 4165

Cena	19,50 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	4165
Kod EAN	5904479041654
Producent	Vitapol

Opis produktu

VITAPOL VITA HERBAL ACTIVIN 100ml

Preparat zawiera wszystkie niezbędne dla królików i gryzoni kwasy organiczne, mikro i makroelementy, optymalnie dobrane proporcje składników mineralnych, niezbędnych do stymulowania procesów przemiany materii i podwyższenia odporności organizmów.

Preparat zawiera zestaw elektrolitów, które regulują równowagę wodno-elektrolitową w organizmie.

Odgrywa ona ważną rolę w ochronie funkcji komórkowych, przepływie krwi i wody przez tkanki, równoważy ciśnienie krwi oraz korzystnie wpływa na odbudowę uszkodzonych tkanek, sprzyja zachowaniu zdrowia i idealnej kondycji zwierząt.

Skład preparatu został opracowany specjalnie dla królików i innych zwierząt futerkowych, nie zawiera substancji szkodliwych dla tych zwierząt.

Vita Herbal Activin:

- Przeznaczony dla gryzoni i królików
- Zmniejsza ryzyko infekcji jelitowych
- Polecany przy problemach z trawieniem i rozluźnionych odchodach
- Stymuluje procesy przemiany materii i podwyższa odporność organizmu
 - Zawiera zestaw elektrolitów

Skład w 1l: chlorek sodu (11.4.1), chlorek potasu (11.5.1), dekstroza (13.2.2)

Dodatki dietetyczne (w 1l): Pierwiastki śladowe: Zn (cynk - 3b605) 20 mg, Mn (mangan - 3b503) 19 mg, Fe (żelazo - 3b103) 10 mg, Cu (miedź - 3b405) 4 mg, I (jod - 3b201) 1 mg, Co (kobalt - 3b305) 0,6 mg

Technologiczne: kwas propionowy (E280), kwas cytrynowy (E330), kwas jabłkowy (E296), kwas octowy (E260), kwas mlekowy (E270)

Analiza (w 1l): Na (sód) 3900 mg, K (potas) 2500 mg, Ca (wapń) $\leq 0,01\%$, Białko surowe 0%, Włókno surowe 0%, Tłuszcz surowy 0%, Popiół surowy 0,6%

Zalecenia: Dla zmniejszenia ryzyka zagrożenia infekcjami jelitowymi; Profilaktycznie dla zachowania zdrowia zwierząt; Przy problemach z trawieniem i rozluźnionych odchodach

Stosowanie:

W zestawie znajduje się miarka z podziałką na 2,5 ml, 5 ml, 7,5 ml oraz 10 ml.

Pierwsze 3 dni - 3 ml (1 łyżka stołowa)/1 L wody do picia

Pozostałe dni - 6 ml/1 L wody do picia

Zaleca się podawanie preparatu rano.

Uwagi:

Chronić przed światłem, szczególnie słonecznym, oraz wilgocią i temperaturą poniżej $+5^{\circ}\text{C}$ oraz powyżej $+28^{\circ}\text{C}$.

Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.

Produkt wyłącznie dla zwierząt.